- DRANKBEPERKING na epidurale verdoving
- BENCHRUST 6 weken
- RX 2 weken + HECHTINGEN
- Begin OPBOUW ACTIVITEIT op 15de dag
- RX 6 weken
- BUITEN aan LEIBAND tot 10 weken

HEUPPROTHESE

Vanaf "dag 15"

- De eerste 6 WEKEN, NOOIT en NERGENS los van de hand én in totaal 10 WEKEN buiten nooit los van de leiband (ook in eigen tuin)
  In uw afwezigheid of wanneer u de hond niet kan vasthouden, in bench laten. GLADDE VLOEREN VERMIJDEN !!
- De eerste 14 dagen enkel buiten voor de behoeftes (aan de leiband !!) en de eerste 3 dagen ijs opleggen, 10 à15min (huid niet vochtig maken)
- Vanaf de 4de dag (tot zeker de 14de), 3 x daags voor het uitlaten opwarmen (10min), bij terugkeer ijs leggen
- Vanaf 15de dag wandelingen starten, 3x daags 15min, elke week de wandelingen met 5 minuten per keer opdrijven, (op "maat" van uw dier)
  Als u merkt dat uw dier bij een bepaalde snelheid de poot niet gebruikt, maar bij trager stappen wel, dan verlaagt u de snelheid zo dat uw dier de poot wel gebruikt
- Vanaf de 7de week (= na 2de RX controle) mogen volledige wandelingen, maar tot en met 10de week AAN de LEIBAND !!

INDIEN U ONGERUST BENT OVER IETS:

– Kijk na op onze website www.huisdierchirurgie-verdonck.be bij de operatie die uw dier onderging en kijk onder "Is dit normaal of is dit een complicatie": hier vindt u foto's van een aantal situaties waartussen u misschien deze van uw dier herkent.
Zo vindt u waarschijnlijk wat u kan/moet doen.

Indien dit niet volstaat: *bel ons op 03 455 46 40*
mail ons op info@huisdierchirurgie.be
al dan niet met een foto van de situatie

DRANKBEPERKING na EPIDURALE verdoving

- De dag van de ingreep thuis maximum 100 à 300 ml water (afhankelijk van de grootte van uw dier), verspreid over de rest van de dag
- Vanaf 's anderendaags normale hoeveelheid drinken
- Het kan tot 's anderdaags 's avonds duren eer de plasreflex weer op gang komt
- Gaan op de plekken waar uw dier gewoonlijk urineert en reukvlaggen van andere dieren ruikt, stimuleert de plasreflex