

- 1 x RX op 6 weken na de ingreep
- geen RX controle nodig

- geen RX controle nodig



- Likken en knabbelen aan de wonde steeds verhinderen, eventueel met een kraag
- De eerste 6 WEKEN niet buiten laten
- Indien uw kat het toelaat: de eerste 3 dagen 3 x daags ijs opleggen, 10 à 15min
- In uw afwezigheid in de bench laten, u mag ze er zo vaak uithalen om op de schoot te houden als u wenst, maar ze mag er niet af springen
- Vanaf de 4e dag 3x daags al kleine "wandelingetjes" van 15 minuten in huis, onder visuele controle, eventueel met een kattengareeltje aan de leiband, in een ruimte waar de kat nergens op of af kan springen; indien uw kat het toelaat, vooraf opwarmen (10min met gelpack of kersepitkussen) **Opgepast:** steeds testen of het niet te heet is, na het "wandelingetje" terug ijs leggen
- Om de paar dagen de wandelingen opdrijven "op maat van uw kat"

INDIEN U ONGERUST BENT OVER IETS:

- Kijk na op onze website www.huisdierchirurgie-verdonck.be bij de operatie die uw dier onderging en kijk onder "Is dit normaal of is dit een complicatie": hier vindt u foto's van een aantal situaties waartussen u misschien deze van uw dier herkent.
Zo vindt u waarschijnlijk wat u kan/moet doen.

Indien dit niet volstaat: *bel ons op 03 455 46 40*
mail ons op info@huisdierchirurgie.be
al dan niet met een foto van de situatie

DRANKBEPERKING na EPIDURALE verdoving

- De dag van de ingreep thuis maximum 100 ml water verspreid over de rest van de dag
- Vanaf 's anderendaags normale hoeveelheid drinken
- Het kan tot 's anderdaags 's avonds duren eer de plasreflex weer op gang komt

- Likken en knabbelen aan de wonde steeds verhinderen, eventueel met een kraag
- De eerste 6 WEKEN niet buiten laten en binnen in een bench houden waarvan de eerste 2 weken NOOIT zonder begeleiding vrij in huis rondlopen
Op de schoot houden mag wel
- Indien uw kat het toelaat: de eerste 3 dagen, 3 x daags ijs opleggen, 10 à 15min
- Indien uw kat fysiotherapie-oefeningen toelaat, kan u dit doen vanaf de 4de dag tot zeker de 14de dag, 3x daags. Vlak ervoor opwarmen (10min) met gelpack of kersepitkussen. **Opgepast:** steeds testen of het niet te heet is, nadien terug ijs leggen
- Vanaf de 15e dag: 3x daags onder begeleiding wat rondlopen in een ruimte waar de kat nergens op of af kan springen; per week de wandelingen opdrijven "op maat van uw kat en uw tijd"
- Vanaf de 7e week vrij in huis rondlopen, maar nog 3 weken binnen houden

BREUKEN MET SPALK

- 2 x RX: eerste keer op 2 weken na de ingreep doorheen de spalk, nogmaals RX op 6 weken na verwijderen spalk

- Knabbelen aan de spalk steeds verhinderen, eventueel met een kraag
- De eerste 6 WEKEN niet buiten laten
- In uw afwezigheid in de bench laten, u mag ze er zo vaak uithalen om op de schoot te houden als u wenst, maar ze mag er niet af springen
- Vanaf de 4de dag 3x daags al kleine “wandelingetjes” van 15min in huis, onder visuele controle, eventueel met een kattengareeltje aan een leiband, in een ruimte waar de kat nergens op of af kan springen
- Om de paar dagen de wandelingen opdrijven “op maat van uw kat”
- Na de foto’s op 6 weken en het verwijderen van het spalk, mag uw kat vrij in huis rondlopen, maar best nog 3 weken binnen houden

BREUKEN ZONDER SPALK

- 2 x RX: op 2 weken na de ingreep en nogmaals op 6 weken na de ingreep

- Knabbelen aan de spalk steeds verhinderen, eventueel met een kraag
- De eerste 6 WEKEN niet buiten laten en binnen in een bench houden, waarvan de eerste 2 weken nooit zonder begeleiding vrij in huis rondlopen. Op de schoot mag wel
- Indien uw kat het toelaat: de eerste 3 dagen 3x daags ijs leggen, 10 a`15min
- Indien uw kat fysiotherapie-oefeningen toelaat, kan u dit doen vanaf de 4de dag tot zeker de 14de dag, 3x daags. Vlak ervoor opwarmen (10min) met gelpack of kersepitkussen. Opgepast: steeds testen of het niet te heet is, nadien terug ijs leggen
- Vanaf de15e dag: 3x daags onder begeleiding wat rondlopen in een ruimte waar de kat nergens op of af kan springen; per week de wandelingen opdrijven “op maat van uw kat en uw tijd”, eventueel met een kattengareeltje aan een leiband
- Vanaf de 7e week vrij in huis rondlopen, maar nog 3 weken binnen houden

HDC